

## بررسی تغییرات قند خون و الکتروولیت‌های سرم قبل و پس از الکتروشوک درمانی

علی‌رضا ابراهیم‌سلطانی<sup>۱</sup>، آناهید ملکی<sup>۲</sup>، مهرداد گودرزی<sup>\*</sup><sup>۲</sup>، شاهین آخوندزاده<sup>۴</sup>، هادی کاظمی<sup>۵</sup>، شهریار اربابی<sup>۶</sup>، عبدالله پیرو<sup>۶</sup>

۱. دانشیار گروه بیهوده‌شی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان
۲. استادیار گروه بیهوده‌شی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان
۳. استادیار گروه بیهوده‌شی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزیه
۴. استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵. استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شاهد، بیمارستان خاتم الانبیا
۶. پژوهش عمومی

### چکیده

**زمینه و هدف:** استفاده از الکتروشوک درمانی در بیماری‌هایی نظیر افسردگی شدید بویژه در مواردی کاربرد دارد که بیمار به دارو پاسخ مناسب نمی‌دهد یا در حاملگی که دارو برای جنین زیان‌آور است. از آنجایی که الکتروشوک درمانی تحت بیهوده‌شی عمومی انجام می‌شود، بنابراین قبل از آن مانند هر بیهوده‌شی دیگری معاینات لازم و آزمایشات لازم برای بیمار باید انجام شود. در بین بیماران تحت الکتروشوک درمانی بیماران مبتلا به دیابت نیز وجود دارد بنابراین تاثیر الکتروشوک درمانی روی قند و سایر الکتروولیت‌ها اهمیت دارد.

**روش بررسی:** از بین بیماران نامزد الکتروشوک درمانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند یک نمونه خون قبل از الکتروشوک درمانی گرفته شد، پس از گذشت ۳۰ ثانیه از تجویز اکسیژن، القاء بیهوده‌شی با تیوبینتال سدیم و ساکسنیل کولین انجام شد. طی بیهوده‌شی بیماران تحت درمان با الکتروشوک قرار گرفتند. ۲۰ دقیقه پس از انجام الکتروشوک درمانی مجدد نمونه خون گرفته شد و نمونه‌های خون از نظر قند و الکتروولیت‌ها بررسی شدند. اطلاعات، جمع‌آوری شده و تحت آنالیز آماری قرار گرفت.

**یافته‌ها:** هفتاد بیمار نامزد الکتروشوک درمانی تحت مطالعه قرار گرفتند و قند و سایر الکتروولیت‌ها قبل و بعد از الکتروشوک اندازه‌گیری شد. تفاوت معنی‌داری از نظر قند خون در زنان و مردان و از نظر سدیم در زنان و مردان و از نظر پتاسیم در مردان قبل و پس از الکتروشوک وجود داشت. اما سطح کلسیم قبل و پس از الکتروشوک در هر دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. سطح پتاسیم در زنان قبل و پس از الکتروشوک تفاوت معنی‌داری نداشت.

**نتیجه‌گیری:** چون الکتروشوک درمانی زیر بیهوده‌شی عمومی انجام می‌شود ضروری است که معاینه فیزیکی کامل و آزمایشات لازم قبل از انجام الکتروشوک درمانی انجام شود. با توجه به اینکه در اثر الکتروشوک درمانی تغییراتی در مقادیر الکتروولیت‌های سرم رخ می‌دهد، توجه به این الکتروولیت‌ها مخصوصاً سدیم و پتاسیم حائز اهمیت است.

**واژگان کلیدی:** تغییرات قند خون، الکتروولیت‌های سرم، الکتروشوک درمانی

\*آدرس نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان  
پست الکترونیک: Drgoudarzi@tums.ac.ir

## روش نمونه‌گیری

از بیماران نامزد الکتروشوک درمانی پس از ورود به بخش رضایت کتبی جهت اخذ نمونه خون و انجام آزمایش گرفته شد. یک نمونه خون قبل از القا بیهوشی جهت بررسی قند خون و سایر الکتروولیت‌ها شامل سدیم، پتاسیم و کلسیم گرفته شد. پایش‌های لازم جهت الکتروشوک درمانی مانند اشباع اکسیژن خون شریانی و اندازه‌گیری فشارخون سیستولی و دیاستولی به روش غیرتهاجمی و الکتروکاردیوگرافی قبل از الکتروشوک درمانی حین و پس از آن بعمل آمد. پس از 30 ثانیه تجویز اکسیژن، القاء بیهوشی با تیوپنتانل سدیم ۳-۵ میلی‌گرم به ازای کیلوگرم و ساکسنیل کولین ۰/۵ میلی‌گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن انجام شد. پس از ۲۰ دقیقه از پایان کار مجدداً نمونه خون وریدی گرفته شد و به آزمایشگاه فرستاده شد.

روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق مشاهده مستقیم آزمایشات بیمار و ثبت در پرسشنامه به عمل آمد. این مقادیر پس از جمع‌آوری در فرم جمع‌آوری اطلاعات تحت آنالیز آماری با نرم افزار SPSS 13 قرار گرفت و گزارش نهایی تهیه شد و نتایج ارائه شده است.

## یافته‌ها

نمونه‌ها ۷۰ مورد بودند که از این تعداد ۴۹ نفر مرد (۷۰٪) و ۲۱ نفر زن (۳۰٪) موردمطالعه قرار گرفتند. میانگین قند خون در قبل از الکتروشوک درمانی  $29/2 \pm 8/8$  و پس از آن  $29/9 \pm 8/8$  بود که تفاوت معنی‌داری داشته است (مقدار P برابر ۰/۰۱۶). تغییرات سطح پتاسیم در مردان قبل و پس از الکتروشوک درمانی (مقدار P برابر ۰/۰۰۵) و تغییرات سطح سدیم در مردان قبل

## مقدمه

استفاده از الکتروشوک درمانی (ECT) در برخی بیماری‌های روانی مانند افسردگی شدید مخصوصاً در مواردی که بیمار به درمان دارویی پاسخ مناسبی نمی‌دهد<sup>(۱-۵)</sup> یا در موارد زن باردار<sup>(۱۳، ۱۴)</sup> که دارو عوارض زیادی دارد یا در مواردی که احتمال آسیب به دیگران و به خود وجود دارد و لازم است که بیمار سریع از آن وضع خارج شود<sup>(۱۰-۱۲)</sup> یا در موارد مقاومت دارویی<sup>(۱۱، ۹، ۶)</sup> یا در موارد کاربرد دارد. از انجایی که الکتروشوک درمانی تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود لازم است که معاینات فیزیکی و آزمایشات لازم بر اساس وضعیت بیمار انجام شود. در بین بیماران الکتروشوک درمانی بیماران مبتلا به دیابت هم وجود دارد و با توجه به این مسئله که بیماران نیاز به بیهوشی عمومی دارند و در طول شب ناشتا بوده اند (حداقل ۸ ساعت) و استرس می‌تواند باعث تغییر در قند خون شود و ناشتا بودن ممکن است تغییراتی در سطح الکتروولیتی ایجاد کند، ارزیابی قند و الکتروولیت‌ها اهمیت دارد.

## روش مطالعه

پس از تصویب کمیته اخلاق پزشکی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی است بر روی ۷۰ نفر بیمار ۱۸ تا ۷۰ ساله با کلاس ASA یک و دو که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و نیاز به الکتروشوک درمانی داشتند، انجام گرفت. بیمارانی که کورتیکواسترویید مصرف می‌کردند از مطالعه حذف شدند. مراحل مختلف مطالعه برای بیماران توضیح داده شد.

الکتروشوک درمانی تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهد (در مرد  $P = 0.574$  و در زن  $P = 0.114$ ). تغییرات سطح قند، سدیم، پتاسیم و کلسیم قبل و پس از الکتروشوک - درمانی و مقدار  $P$  مربوطه به تفکیک جنسیتی در جدول شماره یک آمده است.

و پس از الکتروشوک درمانی (مقدار  $P = 0.001$ ) و تغییرات سطح سدیم در زنان قبل و پس از الکتروشوک درمانی (مقدار  $P = 0.001$ ) تفاوت معنی‌داری داشته است. در حالی که تغییرات سطح پتاسیم در زنان قبل و پس از الکتروشوک تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد (ارزش  $P = 0.655$ ) و سطح کلسیم در تمام بیماران (مرد وزن) قبل و پس از

جدول 1: تغییرات قند، سدیم، پتاسیم و کلسیم قبل و پس از الکتروشوک تراپی به تفکیک جنسیتی

قند				
کلسیم	پتاسیم	سدیم		
قبل از ECT (مرد)				
$9/8 \pm 0/6$	$3/7 \pm 0/5$	$136/1 \pm 6/0$	$90/63 \pm 33/45$	
پس از ECT (مرد)				
$9/7 \pm 0/5$	$3/9 \pm 0/5$	$139/6 \pm 4/8$	$97/10 \pm 34/1$	
				مقدار $P$
قبل از ECT (زن)				
$0/574$	$0/005$	$0/001$	$0/001$	
پس از ECT (زن)				
$10/1 \pm 0/7$	$3/6 \pm 0/3$	$134/6 \pm 9/3$	$77/8 \pm 12/1$	
				مقدار $P$
قبل از ECT (زن)				
$9/9 \pm 0/8$	$3/6 \pm 0/4$	$136/9 \pm 4/9$	$82/9 \pm 12/3$	
پس از ECT (زن)				
$0/114$	$0/655$	$0/001$	$0/001$	مقدار $P$

بلوک و آریتمی می‌کند.<sup>(17)</sup> در مطالعه‌ای 21 بیمار دچار عوارض شدند که بیشتر این عوارض قلبی بوده است.<sup>(6)</sup> تاکیکاردی بطنی نیز گزارش شده است.<sup>(18)</sup> در مطالعه راسموسن در سال 2006، در بیماران دیابتی نوع دو که به علت افسردگی نیاز به الکتروشوک داشتند قبل و 20 دقیقه پس از الکتروشوک قند خون را سنجیده‌اند و مشاهده شد که قند خون به میزان  $0/9$  افزایش می‌یابد.<sup>(7)</sup> در مطالعه راسموسن در سال 2005 در بیماران غیر دیابتی که تحت الکتروشوک درمانی قرار گرفته بودند قند خون قبل و پس از الکتروشوک درمانی اندازه گیری شد و قند خون به

## بحث

الکتروشوک درمانی تحت بیهوشی عمومی نیازمند معاینه فیزیکی و انجام آزمایشات لازم است. در برخی مطالعات کشورهای دیگر الکتروشوک-درمانی اثر زیادی روی الکتروولیتها نداشته است. بررسی الکتروکاردیوگرافی و اندازه گیری سدیم و پتاسیم قبل از الکتروشوک درمانی روش غربالگری موثری است.<sup>(15)</sup> انجام گرافی سینه هیچ مزیتی نداشته است.<sup>(2)</sup> ارتباطی بین سدیم سرم و آستانه تشنج وجود ندارد.<sup>(16)</sup> در برخی بیماران فاصله Q-T افزایش می‌یابد که بیمار را مستعد

در محدوده طبیعی قرار دارد و نگرانی زیادی از جهت بالا رفتن خیلی زیاد قند و الکتروولیتها وجود ندارد ولی بیمارانی که در انتهای محدوده طبیعی قرار دارند نیاز به توجه بیشتری دارند. با توجه به اینکه این بیماران داروهای متعددی مصرف می کنند و احتمال تغییر در الکتروولیتها وجود دارد لازم است که قبل از بیهوشی الکتروولیتها چک شود. در صورتی که اقدامات ضروری انجام پذیرد الکتروشوک درمانی جزء درمان های کم خطر محسوب می شود.

اندازه ۹۱ میلی گرم در دسی لیتر افزایش یافت.<sup>(۸)</sup> در مطالعه فخری در سال ۱۹۸۰، ۱۵ بیمار دیابتی تحت درمان با الکتروشوک قرار گرفتند و مشخص شد که الکتروشوک در بیماران دیابتی ضرر ندارد<sup>(۹)</sup>. در این مطالعه دیده شد که الکتروشوک می تواند سطح سدیم و پتاسیم و قند خون را بطور محسوس و معنی داری بالا ببرد (جدول ۱)، ولی روی سطح کلسیم اثر نداشته است. بالا رفتن قند و الکتروولیتها ی مانند سدیم و پتاسیم از جمله عوارض این روش است اما باز هم در تمام بیماران

## منابع

۱. Muller PS, Albin SM, Barnes RD-Rasmussen KG. jr. Safety of Electroconvulsive therapy in patients with unrepaired abdominal aortic aneurism: report of ۸ patients. Division of General internal medicine, Mayo clinic.J ECT ۲۰۰۹ sep; ۲۵(۳):۱۶۵-۹
۲. Abarmcuic A, Rose NM. Pre anaesthetic assessment & the prevention of post-ECT morbidity. Bar j Psychiatry ۱۹۷۹ jun; ۱۳۴:۵۸۲-۷
۳. Van Hercke, Sienaert P, Hagon A. Electroconvulsive therapy for patients with intracranial aneurism:A case study and literature review. Psychiatr ۲۰۰۹, ۵۱:۴۳-۵۱
۴. Lunde ME, Lee EK.Rasmussen KG. Electro-convulsion therapy in patients with epilepsy Mayo clinic. Epilepsy Behave ۲۰۰۶ ,sep ۹(۱):۳۵۵-۹ EPub ۲۰۰۶ jul ۲۸
۵. Masachettis KL, Fiore La, Peluso MA, Rigonatti SP. Safety and efficacy of ECT in mental disorders associated with epilepsy: report of ۳ cases. J ECT ۲۰۰۳ sep ۱۹(۳), ۱۷۵-۶
۶. Ferrill MJ, Kehoe WA, Jacisin jj. ECT during pregnancy:physiologic and pharmacologic consideration. Convuls ther, ۱۹۹۲; ۸(۳): ۱۸۶-۲۰
۷. Anderson EI, Refi IM. ECT in pregnancy: a review of the literature from ۱۹۴۱-۲۰۰۷. Psychosom med ۲۰۰۹ FEB :۳۳۵-۴۲
۸. Nuttall GA, Bouwersox, Dnglass SB. Morbidity and Mortality in the use of ECT ۲۰۰۴ dec (۴):۲۳۷-۴۱
۹. Fakhri O, Fadhi AA, Elrawi RM. Effect of electroconvulsive therapy therapy on diabetics mellitus. Lancet ۱۹۸۰ oct ۱۱: ۲(۸۱۹۸): ۷۷۵-۵
۱۰. Teh S.p.c, Helmes E, Drake,D. A western Australian Survey on Public Attitudes Toward and Knowledge of Electroconvulsive therapy. International journal of social psychiatry ۲۰۰۷, Vol ۵۳, No ۳, ۲۴۷-۲۷۱.
۱۱. E.B. SOLOMONT. Shock Therapy Emerges As detail in therapist killing- February ۲۱, ۲۰۰۸- the New York Sun Chiristofer Faherty : ۲۰۰۸, ۰۴-۱۳
۱۲. Abrams, Richard, coelho, Paulo. Electro-convulsivetherapy, Oxford University of press, ۲۰۰۲. Harpercollins publisher. ۹۷۸-۱۲
۱۳. Ramussen K G.Rayan DA,Muller PS. Blood Glucose before &after ECT treatments in type ۲ diabetic patients. J ECT ۲۰۰۶ June ۲۲; ۲: ۱۲۴-۶
۱۴. Ramussen K G.Rayan Da. The effect of electroconvulsive therapy treatment on blood glucose in non diabetic patients. J ECT ۲۰۰۵ Des: ۲۱(۴): ۲۳-۴
۱۵. Lafferty je,North cs,spitznag. Laboratory screening prior to ECT. J ECT, ۲۰۰۱ sep ۱۷(۳): ۱۵۸-۶۵
۱۶. Rasmussen KG. Serum Sodium does not correlate with Seizure Length or seizure threshold in ECT. ۲۰۰۷ sep ۲۳(۳): ۱۷۴-۶
۱۷. Rasmusen KG,Mohan A, Steven SR . Assessment of QT interval and QT displacement during electroconvulsivetherapy using computerized Measurment:J ect ۲۰۱۰ Mar ۲۶(1): ۴۱-۶
۱۸. Satoy, Takashi H, Miaybe M. Case of premature ventricular contraction immediately after ECT in a depressive patient: Masui. ۲۰۰۵ Jan, ۵۴(1): ۴۶-۸.

## The Evaluation of Blood Glucose and Serum Electrolyte changes before and after Electroconvulsive Therapy under General Anesthesia

Ali-reza Ebrahim-soltani<sup>۱</sup>, Anahid Maleki<sup>۲</sup>, Mehrdad Goudarzi<sup>۳\*</sup>, Khosro Afkham<sup>۴</sup>, Shahin Akhoondzadeh<sup>۵</sup>, Hadi Kazemi<sup>۶</sup>, Shahriar Arbab<sup>۷</sup>, Abdollah Peyro<sup>۸</sup>

<sup>۱</sup>- Associate Professor of Anesthesiology, Koodakan Medical Center

<sup>۲</sup>- Assistant Professor of Anesthesiology, Koodakan Medical Center

<sup>۳</sup>- Assistant Professor of Anesthesiology, Roozbeh Hospital

<sup>۴</sup>- Professor of Pharmacology, Tehran University of Medical Sciences

<sup>۵</sup>- Assistant Professor of Pediatrics, Khatamol-anbia Hospital

<sup>۶</sup>- General Practitioner

---

### Abstract

**Background:** Electroconvulsive therapy (ECT) is used in the treatment of various medical conditions such as severe depression, mainly in situations where the patient does not respond effectively to drug treatment and during pregnancy where drug intake can result in severe complication for fetus. ECT carried out under general anesthesia, therefore before ECT some physical exam and some lab data is necessary. Patients who are ECT candidates also include diabetic patients which renders the study of the effect of ECT on blood glucose and serum electrolyte level significantly important.

**Methods:** Blood sample were taken from patients before induction of anesthesia. After ۱۰ seconds preoxygenation anesthesia was induced by making use of sodium thiopental and succinylcholine. ۲۰ minutes after ECT, the second blood samples were taken. The resulting data was gathered and then subjected to statistical analysis.

**Results:** To investigate changes in blood sugar and serum electrolytes level in ۲۰ patients who were subjected to ECT, significant changes were noted in pre and post ECT in glucose between men and women and sodium in men and women and potassium in men. But no significant changes were noted in pre and post ECT calcium level and in potassium level in women.

**Conclusion:** ECT carried out under general anesthesia; therefore pre ECT physical exam and blood samples are required. Electrolytes change under ECT, therefore attention to these electrolytes specially sodium and potassium are important

**Keywords:** Blood glucose change, serum electrolytes, electroconvulsion therapy

---

**\*Corresponding Author:** Dr Mehrdad Goudarzi, Department of anesthesiology, Children Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

E mail: Drgoudarzi@tums.ac.ir