

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوده‌ی و درد، دوره ۷، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۵

مقایسه بلوک عصب اوپتوراتور با بلوک عصب فمورال در د بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو

حمیدرضا فیض^{*}، پوپک رحیمزاده^۱، فرناد ایمانی^۲، محمود رضا آلبویه^۱، زهرا اسفندیاری^۳

۱. دانشیار بیهوده‌ی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲. استاد بیهوده‌ی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳. دستیار بیهوده‌ی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ پذیرش: ۹۵/۵/۳۱

تاریخ بازبینی: ۹۵/۴/۲۷

تاریخ دریافت: ۹۴/۱/۴

چکیده

زمینه و هدف: بلوک عصب فمورال روش رایج تامین بی‌دردی برای بیماران تحت آرتروسکوپی زانو می‌باشد اما عصبدهی زانو تنها از این عصب تامین نمی‌شود و یکی از اعصاب دیگری که در عصبدهی زانو نقش دارد عصب اوپتوراتور است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله‌ای دوسوکور ۶۰ نفر از بیماران کاندید انجام جراحی الکتیو آرتروسکوپی زانو به طور تصادفی به ۲ گروه به تعداد مساوی تقسیم شدند. در یک گروه بلوک عصب فمورال و دیگری بلوک اوپتوراتور انجام شد. بیماران از لحاظ شدت درد با ابزار مقیاس دیداری درد و همچنین میزان رضایتمندی [بر اساس مقیاس عالی(۱)، خوب(۲)، متوسط(۳) و ناراضی(۴)] مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: در حال استراحت در تمام ساعات اندازه‌گیری شده به جز ساعت ۲۴ در بلوک فمورال کمتر از بلوک اوپتوراتور بود اما در ساعت ۰، ۳ و ۶ پس از انجام بلوک این اختلاف معنی‌دار بود ($P < 0.001$). گروه فمورال در ساعت ۲۴ میزان رضایتمندی بیشتری را نسبت به گروه اوپتوراتور نشان دادند ($P = 0.034$).

نتیجه‌گیری: گروه تحت بلوک عصب فمورال میزان درد کمتر و رضایتمندی بیشتری را نسبت به بیماران گروه تحت بلوک اوپتوراتور داشتند هر چند میانگین مقیاس دیداری درد در تمام ساعات پس از بلوک در هر دو گروه میزان قابل قبولی برای بی‌دردی پس از عمل بود.

واژه‌های کلیدی: بلوک عصب، آرتروسکوپی، درد

می‌شود. بلوک اعصاب محیطی باعث کاهش هزینه‌های بیمارستانی می‌شود و همچنین بی‌دردی عالی بعد از جراحی ایجاد می‌کند که نتیجه آن مصرف کمتر اپیوپیدها و عوارض جانبی کمتر است^(۱). بلوک‌های مختلفی جهت کنترل درد پس از عمل نظریه بلوک عصب فمورال و شاخه‌های آن به کار گرفته شده است. همچنین بلوک

مقدمه
با توجه به درد بعد از عمل جراحی آرتروسکوپی تلاش‌هایی برای کاهش این درد صورت گرفته است. بدیهی است کاهش درد نقش زیادی در شروع زودرس حرکات بیمار و بازتوانی وی دارد^(۲-۴). معمولاً از داروهای مسكن و مخدّرها برای کاهش درد بعد از عمل استفاده

روانی، پذیرش بیمار و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر. تمامی مطالعه با کسب رضایت شخصی از بیماران صورت گرفته و جزئیات مطالعه و عوارض برای بیماران شرح داده شدتا از روند درمان خود اطلاعات کافی داشته باشند. هیچ هزینه‌ای به بیماران تحمیل نشد. کد ثبت در پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی IRCT2015042121878N1 می‌باشد. حجم نمونه هم با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

$$N=2(Z_{1-\alpha}/2+Z_{1-\beta})^2/(\mu_1-\mu_2/sd)^2$$

بر اساس فرمول فوق و با فرض $\alpha = 0.05$ و $\beta = 0.2$ اساس مطالعه شماره ۷ در هر گروه ۳۰ نفر تعیین می‌گردد. بیماران به صورت تصادفی به روش تصادفی‌سازی بلوکیدر ۲ گروه مساوی تقسیم شدند. بیمار از نوع بلوك انجام شده اطلاع ندارد. سپس تمامی بیماران تحت بیهوشی عمومی با تکنیک یکسان قرار گرفتند. قبل از بیدار شدن ۱ گرم آپوتل به بیماران تجویز شد.

سپس در ریکاوری بر حسب مورد تحت بلوك ابتوراتور یا بلوك فمورال تحت هدایت سونوگرافی با دستگاه اولتراسوند سونو سایت اس نرو با استفاده از سوزن قابل دیدن با سونو ساخت شرکت ویگون فرانسه و با تزریق بوییواکایین ساخت شرکت میلان فرانسه قرار گرفتند. جهت بلوك ابتوراتور ابتدا پای بیمار از ناحیه ران در وضعیت ابداقت و اکسترنال روتاسیون قرار می‌گیرد. پس از آماده‌سازی محل بلوك، پروب سونوگرافی در قسمت مدیال شیار اینگوینال قرار می‌گیرد. پس از شناسایی عضله پکتینئوس، سر پروب ۴۰ تا ۵۰ درجه به سمت کرaniel می‌چرخد تا ساختمان هیپراکو در قسمت پوسترونال پکتینئوس (لبه تحتانی راموس فوکانی پوبیس) رویت شود. سپس در فضای فاسیای بین دو عضله پکتینئوس و اکسترنال ابتوراتور به صورت out of plan در فضای اینترفاسیال این دو عضله ۱۵ میلی‌لیتر بوپی واکایین درصد تزریق شد.^(۸)

جهت بلوك فمورال پس از آماده‌سازی ناحیه پروب سونوگرافی در محاذات لیگامان اینگوینال قرار می‌گیرد. لترال به شریان و زیر فاسیا ایلیاکا عصب فمورال قرار

عصب ابتوراتور نیز جهت کنترل درد بعد از اعمال جراحی ران و زانو کاربرد داشته است.

بلوك عصب فمورال از تکنیک‌هایی است که انجام آن ساده است و برای اعمال جراحی قسمت قدامی ران و اداره درد بعد از اعمال جراحی فمور و زانو مناسب است. این بلوك در ایجاد بی‌دردی مناسب در حین و پس از اعمال جراحی بازسازی رباط صلبی قدامی گاهی ناموفق است. شاید یکی از دلایل آن نیاز به بلوك عصب ابتوراتور که عصب دهی زانو و تاندون عضله گراسیلیس را در داخل زانو انجام می‌دهد باشد. بنابراین توصیه شده است که بلوك کامل شامل اعصاب فمورال، فمورال سطحی خارجی و ابتوراتور یا یک بلوك اضافه ابتوراتور می‌تواند کیفیت بیهوشی را در طول عمل و همچنین بی‌دردی پس از عمل جراحی زانو را افزایش دهد.^(۷)

همچنین از معایب بلوك عصب فمورال مجاورت با شریان فمورال است که احتمال تزریق داخل شریان یا آسیب به شریان را در پی دارد، همچنین ازعavarض جانبی بلوك فمورال پیوند شریان فمورال می‌باشد. از موارد دیگر احتمال آسیب به عصب فمورال می‌باشد، آسیب آن باعث ناتوانی شدید حرکتی بیمار می‌شود و شاید به این دلیل روش بلوك ابتوراتور بتواند جانشین خوبی برای بی‌دردی پس از اعمال جراحی زانو باشد. ما در این مطالعه مقایسه آن‌ها با هم پرداخته‌ایم.


مواد و روش‌ها

در این مطالعه مداخله‌ای دوسوکور جمعیت هدف عبارتست از کلیه بیماران کاندید جراحی الکتیو آرتروسکوپی زانو جهت ترمیم رباط صلبی قدامی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال‌های ۹۳-۹۴ بر اساس معیارهای ورود شامل: سن ۱۸ تا ۵۰ سال، طبقه‌بندی انجمن بیهوشی امریکا ۱ و ۲، نداشتن اختلالات انقدادی، عدم وجود عفونت محل تزریق، نبود اختلالات عصبی در پای محل عمل، حساسیت نداشتن به بی‌حسی موضعی، شاخص توده بدنی کمتر از ۳۵، نداشتن اختلالات

محاسبه شد. انفوژیون پایه برای بیمار قرار داده نشد تا فقط درخواستها ثبت و اندازه‌گیری شود. بعد از انجام بلوك، بیمار در ساعتهاي ۰، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از آن از پس از انجام بلوك، ۳، ۶ و ۲۴ ساعت لاحاظ شدت درد با ابزار مقیاس دیداری درد و همچنین میزان رضایتمندی در ساعت ۲۴ [بر اساس مقیاس عالی^(۱)، خوب^(۲)، متوسط^(۳) و ناراضی^(۴)] توسط فرد ثالث که از نحوه بلوك انجام شده برای بیمار اطلاعی ندارد، ارزیابی می‌شود. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ انجام گرفت.

دارد. سوزن به صورت in-plane از سمت خارج شریان وارد شده و به سمت عصب فمورال هدایت می‌شود. تزریق به صورت پری‌نورال با ۱۵ میلی‌لیتر بوبیپ و اکایین ۰/۲ درصد انجام شد.

بعد از آن جهت یکسان‌سازی وضعیت کنترل درد در هر دو گروه، پمپ کنترل درد (دیژیتال‌فسورز با برنامه‌ریزی) با دوز ۲ گرم آپوتل و ۵۰۰ میکروگرم فنتانیل که به حجم ۵۰ میلی‌لیتر رسیده است به صورت بولوس به میزان ۱ میلی‌لیتر با فواصل زمانی قابل تزریق هر ۱۵ دقیقه قرار داده شد که در صورت بروز درد به صورت بولوس توسط بیمار تجویز می‌شد و زمان مسکن ابتدایی و دوز کلی



شکل ۱. نمای سونوگرافی عصب فمورال (سمت چپ) و ابتوراتور (سمت راست). FN عصب فمورال، FA شریان فمورال، FV ورید فمورال. AL عضله اداکتورلونگوس، AB عضله اداکتوربرویس، OE عضله ابتوراتور خارجی، PE عضله پکتینوس، SPR راموس فوقانی پوبیس.

ساعت بعد از بلوك ($P<0.001$) در گروه ابتوراتور نسبت به فمورال بیشتر بود. (جدول ۱ و ۲). میانگین رتبه درد با فلکسیون ۳۰ درجه زانو در ساعت ۲۴ بین دو گروه ابتوراتور و فمورال اختلاف معناداری نداشت ($P=0.172$). همچنین روند تغییرات درد در هر دو گروه فمورال و ابتوراتور بدین صورت بود که در ابتدا کاهش و سپس بعد از ۲۴ ساعت دوباره افزایش داشت که این مطلب بیانگر تغییرات درد در

یافته‌ها

در این مطالعه اختلاف معناداری بین میانگین متغیرهای سن، جنس، قد، وزن و چاقی در دو گروه فمورال و ابتوراتور دیده نشد. در مطالعه حاضر، برای میانگین رتبه درد بین گروه‌ها و در زمان‌های مختلف اختلاف معناداری دیده شد. میانگین رتبه درد در زمان صفر پس از انجام بلوك ($P=0.048$)، ۳ ساعت بعد از بلوك ($P<0.001$) و ۶

کمی بیشتر از بیماران گروه اوبتوراتور ($1/83 \pm 0/699$) بود ($P=0/034$).

طول زمان می باشد ($1/001 < P$). رضایتمندی ۲۴ ساعت بعد از عمل در بیماران گروه فمورال ($1/47 \pm 0/629$) بود.

جدول ۱. میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد در زمان های مختلف به تفکیک دو گروه اوبتوراتور و فمورال

عدد پی	گروه فمورال		گروه اوبتوراتور		زمان
	میانه (چارک)	میانگین (انحراف معیار)	میانه (چارک)	میانگین (انحراف معیار)	
۰/۶۲۲	(۶/۰۰-۵/۰۰) ۶/۰۰	(۰/۷۳) ۵/۶۳	(۶/۰۰-۵/۰۰) ۵/۰۰	(۰/۸۰) ۵/۵۰	در بدودورود به ریکاوری
۰/۰۴۸	(۴/۰۰-۳/۰۰) ۳/۰۰	(۰/۵۷) ۳/۵۰	(۴/۰۰-۳/۰۰) ۴/۰۰	(۰/۵۰) ۳/۷۷	در ریکاوری ساعت ۰
<۰/۰۰۱	(۲/۰۰-۱/۰۰) ۲/۰۰	(۰/۴۹) ۱/۶۰	(۳/۰۰-۲/۰۰) ۳/۰۰	(۰/۵۰) ۲/۵۷	۳ ساعت پس از بلوك
<۰/۰۰۱	(۲/۰۰-۱/۰۰) ۲/۰۰	(۰/۴۹۸) ۱/۶۰	(۳/۰۰-۲/۰۰) ۳/۰۰	(۰/۵۰) ۲/۵۳	۶ ساعت پس از بلوك
۰/۱۶۰	(۲/۲۵-۱/۰۰) ۲/۰۰	(۰/۷۱۸) ۱/۹۷	(۲/۲۵-۲/۰۰) ۲/۰۰	(۰/۴۸) ۲/۲۰	۱۲ ساعت پس از بلوك
۰/۴۹۹	(۳/۰۰-۳/۰۰) ۳/۰۰	(۰/۶۱۵) ۳/۰۳	(۳/۰۰-۳/۰۰) ۳/۰۰	(۰/۵۲۱) ۲/۹۳	۲۴ ساعت پس از بلوك

جدول ۲. دریافت مسکن اضافه به تفکیک دو گروه اوبتوراتور و فمورال

عدد پی	گروه فمورال	گروه اوبتوراتور	متغیر	
			میانگین (انحراف معیار)	زمان تجویز اولین دوز داروی آنالژیک(ساعت)
۰/۰۷۷	(۴/۵۹) ۲/۷۰	(۱/۲۴) ۱/۹۰	حداقل-حداکثر	میزان کلی داروی آنالژیک صرفی(میلیلیتر در ساعت)
	۲۴-۰	۳-۰		
۰/۶۰۴	(۰/۳۶) ۱/۲۲	(۰/۳۰) ۱/۶۷	حداقل-حداکثر	میزان کلی داروی آنالژیک صرفی(میلیلیتر در ساعت)
	۱/۸۳-۰/۰۴	۲/۰۸-۱/۱۶		

شد.ليو همکاران نشان دادند که استفاده از بلوك فمورال در بى دردی پساز جراحی زانو موثرتر از روپیمپ کنترل دردمی باشد و بیماران درد کمتری را در حال استراحت و حرکت دارند^(۹). در مطالعه کارداشو همکاران در سال ۲۰۰۷ در کانادا پس از عمل تعویض مفصل زانو بلوك فمورال در درد کمتری در حالت استراحت و در حرکت در مقایسه با گروه اوبتوراتور بود. در مورد مصرف مخدراها، عملکرد و عوارض تفاوت معنی داری در بین گروه ها دیده نشد^(۱۰). در متانالیز پلنمراه درد در سه گروه شامل تزریق منفرد

بحث
مطالعات اندکی برای مقایسه بین دو بلوك صورت گرفته است و در اکثر این موارد بلوك اوبتوراتور همراه با سایر بلوك ها برای بى دردی زانو استفاده شده است. همانطور که بیان شد در مطالعه ما نمره درد بر اساس مقیاس دیداری درد در ساعت ۰، ۳ و ۶ پس از انجام بلوك در گروه تحت بلوك عصب فمورال به طور معنی داری کمتر از گروه بلوك اوبتوراتور بود و این فرضیه را که بلوك اوبتوراتور بى دردی مشابه بلوك فمورال ایجاد می کند، رد

بلوک فمورال به طور معناداری بیشتر بود همچنین مصرف مسکن وریدی کمتر و رضایتمندی بیشتری با بلوک فمورال بود^(۱۴). در پژوهش دیگری که توسط پابلو اسکودو و همکاران بر روی بیماران آرتروسکوپی بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو بلوک عصب اوتوراتور در همراهی با بلوک فمورال و سیاتیک جهت بی دردی حین عمل استفاده شد، نیاز به استفاده از آنالژیک وریدی کمی (۱۴٪ بیماران) وجود داشت و هیچ موردی نیاز به انجام بیهوشی عمومی پیدا نکرد^(۱۵). از جمله محدودیتهای مطالعه ما می توان به عدم ثبت مقدار داروی مصرفی در زمان های مختلف در ۲۴ ساعت اول، عدم بررسی مدت زمان بی حسی و بی حرکتی عضلات اداکتور و چهار سر اشاره کرد. همچنین پیشنهاد میشود مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر در آینده انجام شود.

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد که بیماران گروه تحت بلوک عصب فمورال میزان درد کمتر و رضایتمندی بیشتری را نسبت به بیماران گروه تحت بلوک اوتوراتور داشتند. هرچند میزان درد در ساعات ۰، ۳ و ۶ پس از انجام بلوک به طور مشخصی در گروه فمورال کمتر از اوتوراتور بود، میانگین مقیاس دیداری درد در تمام ساعات پس از بلوک اوتوراتور میزان قابل قبولی برای بی دردی پس از عمل بود. بنابراین بلوک اوتوراتور می تواند به عنوان روش بی دردی در بیمارانیکه جراحی آرتروسکوپی زانومی شوند مورد استفاده قرار گیرد.

بلوک عصب فمورال با گروهی که علاوه بر تزریق منفرد بلوک فمورال، بلوک سیاتیک انجام شده بود و گروه سوم بلوک با تزریق مداوم فمورال مشابه بود. میزان مصرف مورفین در هر سه گروه مشابه بود. همچنین بلوک عصب فمورال چه بصورت تزریق مداوم چه تزریق یکباره‌مراه با پمپ مسکن وریدی برای بیمارانی که تحت جراحی آرتروپلاستی مفصل زانو قرار می‌گیرند بهتر از مسکن وریدی به روش پمپ کنترل دردبه تنها یی جهت تسکین درد پس از عمل می‌باشد. بلوک عصب فمورال باعث کاهش مصرف مورفین در ۲۴ ساعت اول پس از عمل و همچنین ۴۸ ساعت اول نسبت به گروهی که فقط پمپ کنترل درداداشتند شد^(۱۶).

در پژوهش امر سعید و کریم یوسف در سال ۲۰۱۵ بلوک کمپارتمان پسوس با بلوک عصب فمورال جهت بی درد پس از جراحی تعویض مفصل زانو مورد مقایسه قرار گرفت، در هر دو گروه مقیاس رتبه بندی عددی درد مشابه در ۲۴ ساعت اول پس از جراحی داشتند و میزان نیاز به مخدیر وریدی که در صورت درد در دو گروه مورد استفاده قرار گرفته بود تفاوتی نداشت^(۱۷). در مطالعه ماریا سیموفوریدو و همکارانش در سال ۲۰۱۳ بر بیماران ترمیم رباط صلیبی قدامی برای بی دردی حین عمل بیماران بلوک سیاتیک، فمورال و اوتوراتور صورت گرفت، نیاز به استفاده از آنالژیک وریدی کمی وجود داشت و فقط یک نفر نیز به علت درد نیاز به بیهوشی عمومی پیدا کرد^(۱۸). در مطالعه ساکورا و همکاران در سال ۲۰۱۰ در ژاپن بیماران جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو بر بیهوده دو گروه تقسیم شدند. در گروه دوم که علاوه بر بلوک عصب فمورال، عصب فمورال سطحی جانبی و عصب سیاتیک یک بلوک اضافه عصب اوتوراتور صورت گرفت به طور مشخصی نیاز به فنتانیل وریدی کمتری در طول جراحی نسبت به گروه بدون بلوک اوتوراتور داشتند^(۱۹). در مطالعه رحیم زاده و همکاران بلوک عصب فمورال در شیار اینگوینال با بلوک عصب اداکتور جهت درد پس از عمل آرتروسکوپی زانو مقایسه شد که کارایی

References

1. Singelyn F.J, Ferrant T, Malisse M.F, Joris D. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidural analgesia, and continuous femoral nerve sheath block on rehabilitation after unilateral total-hip arthroplasty. *Anesth Pain Med.* 2005; 30(5): 452-7.
2. Duarte V.M, Fallis WM, Slonowsky D, Kwarteng K, Yeung C.K. Effectiveness of femoral nerve blockade for pain control after total knee arthroplasty. *J Perianesth Nurs.* 2006; 21(5): 311-6.
3. Jæger P, Nielsen Z.J, Henningsen M.H, Hilsted K.L, Mathiesen O, Dahl JB. Adductor canal block versus femoral nerve block and quadriceps strength: A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study in healthy volunteers. *Anesthesiology.* 2012; 118(2): 409-15
4. Manickam B, Perlas A, Duggan E, Brull R, Chan VW, Ramlogan R. Feasibility and efficacy of ultrasound-guided block of the saphenous nerve in the adductor canal. *Reg Anesth Pain Med.* 2009; 34(6): 578-80.
5. Moghtadaei M, Farahini H, Faiz H, Mokarami F, Safari S. Pain management for total knee arthroplasty: Single-injection femoral nerve block versus local infiltration analgesia. *Iran Red Cres Med J.* 2014; 16(1): e13247.
6. Rahimzadeh P, Feiz H, Ziyaeifard M, Niknam K. Effectiveness of adding ketamine to ropivacaine infusion via femoral nerve catheter after knee anterior cruciate ligament repair. *J Res Med Sci.* 2013; 18(8): 632-636.
7. Sakura S, Hara K, Ota J, Tadenuma S. Ultrasound-guided peripheral nerve blocks for anterior cruciate ligament reconstruction: Effect of obturator nerve block during and after surgery. *J Anesth.* 2010; 24:411-417.
8. Taha A.M. Ultrasound-Guided Obturator Nerve Block: A Proximal Interfascial Technique. *Anesth Analg* 2012;114:236-9
9. Lee R.M, Lim T.J.B, Liang Chua N.H. Postoperative pain control for total knee arthroplasty: Continuous femoral nerve block versus intravenous patient controlled analgesia. *Anesth Pain* 2012; 1(4):239-242.
10. Kardash K, Hickey D, Tessler M.J, Payne S, Zukor D, Velly A. M. Obturator versus femoral nerve block for analgesia after total knee arthroplasty. *Anesth Analg* 2007; 105(3): 853-858.
11. Paul J.E, Arya A, Hurlburt L, Cheng J, Thabane L, et al. Femoral nerve block improves analgesia outcomes after total knee arthroplasty a meta-analysis of randomized controlled trial *Anesthesiology.* 2010; 113: 1144-62.
12. Sayed M.A, Yousef K. Continuous femoral nerve against psoas compartment block for analgesia in total knee arthroplasty. *Ain-Shams Journal of Anaesthesiology.* 2015; 8 (2): 200-205.
13. Simeoforidou M, Bareka M, Basdekis G, Tsakaka K, Chantziki E, Vretzakis G. Peripheral nerve blockade as an exclusive approach to obturator nerve block in anterior cruciate ligament reconstructive surgery. *Korean J Anesth* 2013; 65(5): 410-417.
14. Rahimzadeh P, Imani F, Feiz H, Khaladbarin A, Abbasi A. [Interventional study of ultrasound-guided femoral nerve block in adductor canal and comparison with the classical method in relieving pain after elective knee surgery (Persian)]. *JAP* 2015;6(1):1-8.
15. Escovedo H.P, Conceição D.B, Pavei P, Knaesel J.A. Ultrasound-guided obturator nerve block: A preliminary report of a case series. *Reg Anesth Pain Med* 2007; 32(3): 221-226.

Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of knee

Seyed Hamid Reza Faiz^{1*}, Poupak Rahimzadeh², Farnad Imani³, Mahmood Reza Alebuyeh³, Zahra Esfandiari⁴

1. Seyed Hamid Reza Faiz, Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
2. Poupak Rahimzadeh, Associate Professor, pain fellowship, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
3. Farnad Imani, Professor of Anesthesiology, pain fellowship, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
4. Zahra Esfandiari, Resident of Anesthesiology, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran

ABSTRACT

Aims and background: Femoral nerve block is the common method for controlling pain after knee surgery, but it is not the only knee supplying nerve; therefore its block does not always provide successful pain relief. Another innervation source of the knee is the obturator nerve.

Methods and Materials: In this double-blind study, 60 patients, undergoing elective arthroscopic knee surgery, were randomly divided into 2 groups: the femoral nerve block group and obturator nerve block group. After the block patients were evaluated for pain with visual analogue score (VAS). Also satisfaction scale was inquired as: excellent (1), good (2) moderate (3) and dissatisfied (4). Finally data was analyzed with SPSS 20 software.

Findings: Pain measured at rest in the femoral block group showed less score than the obturator group at every hour except after 24 hours. Also at 0, 3 and 6 hours after the block this difference was statistically significant (at time 0, P value = 0.048 and after 3 and 6 hours p < 0.001). The Femoral block group in 24 showed better satisfaction score than the other group after 24 hours (P value = 0.034).

Conclusion: The study showed that patients undergoing femoral nerve block have less pain and greater satisfaction score compared with patients who were under obturator block. However, VAS in both groups was in an acceptable level of analgesia after surgery.

Key words: nerve block, arthroscopy, pain

► Please cite this paper as:

Faiz S, Rahimzadeh P, Imani F, Alebuyeh M-R, Esfandiari Z. [Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of knee (persian)]. J Anesth pain 2016;6(4):68-74.

Corresponding Author: Seyed Hamid Reza Faiz, Associate professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, junction of Shahid Hemmat & Shahid Chamran, Tehran, Iran

Email: hrfaz@hotmai.com